



Avertissement agricole



التبئيه الزراعي

Cératite des arbres fruitiers

18-06-2020

Le réseau de surveillance déployé au niveau régional, a enregistré une activité intense de la cératite sur pêcher, abricotier et figuier révélée par des captures d'adultes dépassant le seuil de nuisibilité.



Eu égard au stade réceptif aux piqûres de cette mouche, les arboriculteurs sont appelés à réaliser un traitement insecticide de leurs vergers soit :

- **Partiel en traitant une rangée sur deux à l'aide d'un insecticide approprié, associé à un attractif alimentaire (Hydrolysate de protéine).**
- **Total en utilisant un insecticide spécifique touchant tous les arbres du verger.**



NB : Pour assurer une protection efficace des fruits ; il est nécessaire de renouveler le traitement en fonction de la rémanence du produit tout en respectant le délai avant récolte.



Avertissement agricole



التبئيه الزراعي

2020/06/18

ذبابة البحر الأبيض المتوسط على الفواكه



سجلت شبكة المراقبة المتواجدة على المستوى الجهوي، نشاطاً مكثفاً لذبابة الفواكه على فاكهة الخوخ، المشمش و التين كشف عنه نسب اصطياد كبيرة من الحشرات البالغة التي تجاوزت عتبة الضرر و التدخل.

نظرا لقابلية الفواكه للدغات هذه الذبابة، ننصح الفلاحين القيام بمعالجة كيميائية باستعمال مبيد حشري و ذلك إما :



بالرش الجزئي للأشجار عن طريق معالجة صف من إثنين بالمبيد و لكن مضاف إليه جاذب غذائي (بروتين هيدروليزا).

بالرش الكلي لجميع الأشجار بمبيد حشري مخصص و مرخص.

ملاحظة: لضمان الحماية الفعالة للثمار من الضروري تجديد العلاج وفقاً لمدة الفعالية مع احترام المدة ما قبل الجني.