MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Cellule Agrométéorologie

BULLETIN AGRO - METEOROLOGIQUE
N°30

Campagne Agricole 2024/2025
Mois de Mai 2025
Période du 26.05 au 01.06.2025

1. Situation actuelle :

1.1 Situation climatique du : 18 au 24.05.2025

- **Températures (°C) :**

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T°Moy	T° moy Min.	T° moy. Max.	T°Moy
Littoral	16.7	25.2	**20.9**	15.6	24.7	**20.1**	15.8	26.1	**20.9**
Sub Littoral	13.6	28.9	**21.3**	15.1	26.8	**21**	13.4	28	**20.7**
Hauts Plateaux	15.3	28.9	**22.1**	14.8	27.6	**21.2**	12.7	25.5	**19.1**

Observations : Les températures moyennes ont été **saisonnières** sur l'ensemble des régions ; à l'exception des régions des Hauts Plateaux Centre et Est où, elles ont été **en baisse** (écart de **02°C**).

Avec : **Littoral** : minima : 13 à 17°C maxima : 26 à 29°C.
Hauts Plateaux : minima : 13 à 15°C maxima : 26 à 29°C.

- **Pluviométrie (mm) :**

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	04 (Oran et Arzew)	02-05	14 (Bejaïa)
Sub Littoral	-	01-12	-
Hauts Plateaux	-	07 (Djelfa)	00-11

Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Evapotranspiration saisonnière ;
- Pluies relativement appréciables sur les régions Centre et Est ;
- Cassure des branches, chutes des fleurs et des fruits (Arbres fruitiers) à cause des vents et de la grêle, au niveau des régions des Hauts Plateaux Centre et Est ;
- Verse de la céréale au niveau des Hauts Plateaux Centre et Est, causé par les pluies orageuses et de la grêle.
- Reprise des travaux d'entretien sur l'ensemble des cultures dès ressuyage du sol.

Prévisions météo

Lundi 26 mai 2025

Régions Nord (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès) : Le temps sera généralement dégagé. **Les vents** seront variables à secteur Est 15/30 km/h en général.
Régions sahariennes : Le temps sera dégagé à partiellement voilé. Toutefois, quelques formations cumuliformes seront observées sur le Sud-Ouest durant l'après-midi/soirée avec faible tendance orageuse. **Les vents** seront de Nord-Est 20/30 km/h en général, atteignant parfois 40 km/h sur le Sahara oriental et du Sahara central vers la frontière Algéro-Malienne avec des soulèvements de sable locaux. Sur les autres régions, ils seront variables 15/30 km/h en général.

Du mardi 27 au jeudi 29 mai 2025

Région Nord : Le temps sera dégagé à partiellement voilé, avec développement de foyers orageux isolés sur l'intérieur et les Hauts Plateaux de l'Ouest durant les après-midis/soirées.
À noter, quelques bancs de brume avec nuages bas locaux seront observés les débuts des matinées près des côtes Ouest et Centre. Egalement, un temps relativement chaud sur l'axe Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla, notamment le mercredi et le jeudi.
Les températures maximales seront entre 26°C et 34°C en général à l'Ouest et au Centre, atteignant localement 36/39°C sur les régions proches côtières et intérieures de l'Ouest. À l'Est, elles seront entre 22°C et 28°C en général, puis en légère hausse sur les Hauts Plateaux 30/31°C le Jeudi.
Les vents seront faibles à modérés en général. **Rafales de vent sous orages.**

Région Sud : Le temps sera dégagé à partiellement voilé. Toutefois, quelques formations cumuliformes seront observées sur le Sud-Ouest et du Hoggar/Tassili vers le Sud du Sahara oriental durant les après-midis/soirées avec faible tendance orageuse.
Les températures maximales seront entre 38°C et 45°C en général sur l'extrême Sud et de la frontière Algéro-Malienne vers le Sahara central. Sur les autres régions, elles seront entre 28°C et 37°C en général, suivie d'une hausse entre 38°C et 41°C sur la région de Tindouf le mercredi et le jeudi.
Les vents seront faibles à modérés en général, **parfois assez forts sur le Sahara central et de l'extrême Sud vers le Hoggar/Tassili avec quelques soulèvements de sable. Rafales de vent sous orages.**

Impacts agrométéorologiques prévisionnels :

- Légère hausse de l'évapotranspiration ;
- Hausse de l'évapotranspiration, conduisant aux maintiens des irrigations sur les cultures maraichères et arboricoles ;
- Risque d'incendie autour des parcelles ou des espaces verts non désherbés.
- Conditions agrométéorologique favorables pour le fauchage et le bottelage des fourrages ;
- Reprise des travaux d'entretien sur les différentes cultures sur l'ensemble des régions.

1.2- Stade et comportement de la végétation :

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub-littoral	Hauts Plateaux	Observation
Agrumes	**Ouest**	Début grossissement (var. précoce) Nouaison (var. de saison) Nouaison (var. tardives)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Néflier	**Ouest**	Fin maturité	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Rosacées à noyaux Prunier Pêcher Abricotier Amandier	**Ouest**	Maturité (var. précoces) Début maturité (var. de saison) Grossissement (var. tardives)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Rosacées à pépins Pommier	**Ouest**	Grossissement (var. précoces) Début grossissement (var. de saison et tardives)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Olivier	**Ouest**	Grossissement (var. précoces) Début grossissement (var. de saison) Fin nouaison (var. tardives)	-	
	Centre	//	-	
	Est	Gonflement des boutons floraux- début floraison	-	
Vigne	**Ouest**	Nouaison	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts Plateaux	Observation
Pomme de terre de saison	**Ouest**	Tubérisation- maturité	-	-
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Cultures sous serre (Tomate, Piment, Aubergine, Courgette)	**Ouest**	Maturité	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	

1.2.3-Grandes cultures :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts Plateaux	Observation
Blé	**Centre**	Maturité	Laiteux pâteux	-
	Est	//	//	
	Ouest	Laiteux pâteux	//	
Orge et Avoine	**Centre**	Maturité	Laiteux pâteux	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	//	
Légumineuses alimentaires (Lentille, Pois chiche)	**Centre**	Formation de gousse	Formation de gousse	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	//	

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Agrumes	Mineuse Cochenilles Aleurodes Fumagine Pucerons Gommose Parasitaire Anthracnose Acariens	• Surveillance et traitement contre risques ; • Début des irrigations ; • Poursuite de la récolte des variétés tardives ; • Terminer la taille des arbres récoltes ; • Greffage en écussons ; • Poursuite des discages ; • Chaulage des troncs d'arbres.	**Respect du délai avant récolte**
Oliviers	Psylles l'Œil de Paon Thrips	• Surveillance et premier traitement contre les risques ; • Taille en vert (suppression gourmands) ; • Irrigation en cas de nécessité des variétés de table (région ouest) ; • Discage et destruction des mauvaises herbes.	
Vigne	Mildiou Oïdium Acariens Pucerons Thrips	• Surveillance et traitements contre l'Oïdium et le Mildiou pour les vignobles des zones précoces ; • Ebourgeonnage ; • Entretien réseau d'irrigation localisée ; • Enfouissement des engrais verts ; • Epandage du 2eme apport azoté.	**Reprise dés ressuyage du sol.**
Rosacées à pépins	Tavelure **Feu Bactérien** Pucerons Carpocapse	• Désherbage autours des arbres ; • Traitement pré-floral contre la Tavelure, le Moniliose, l'Oïdium et les Pucerons. • Poursuite des irrigations, suivant la nécessité et la région. • Poursuite de l'épandage de la fumure azotée ;	
Rosacées à noyaux	Gommose Parasitaire Alternaria Cloque Tordeuse orientale Acariens Thrips	• Poursuite du traitement contre risques ; • Enfouissement des engrais verts ; • Rayonnages, confection des cuvettes ; • Début des irrigations selon nécessité ; • Début récolte de variétés précoces de pèche.	
Nouvelles plantations 2024/2025		• Irrigation à la citerne des jeunes plantations ; • Tuteurage des jeunes plants.	

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Pomme de terre Arrière-saison	Mildiou Alternariose Fusariose Teigne	• Surveillance et traitement contre risques ; • Respect des mesures prophylactiques (Effeuillage, ébourgeonnage, désherbage) ; • Irrigation et fertilisation.	**Reprise dés ressuyage du sol.**
Tomate	Mildiou Mineuse Thrips Oïdium Aleurodes Alternariose Mildiou Acariens		

1.3.3-Grandes cultures

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Céréales	Oïdium Maladies Foliaires Pucerons Taupin Rouille jaune et brune Fusarium	• Surveillance et traitement contre risques ; • **Confection des par feu et désherbage autour des parcelles afin d'éviter les incendies.**	**Reprise dés ressuyage du sol.**

1.3.4-Phœniciculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Palmier Dattier	Pourriture du cœur Oryctes	• Surveillance et traitement contre risques ; • Entretien des palmiers (désherbage et la taille) ; • Epandage du fumier organique.	-

1.3.5-Production animale :

Filière	Recommandations
Apiculture	• Peuplement et développement des ruches ; • Mise en place des cadres de cire gaufrée et les tapis à pollen ; • Elevage des reines ; • Production de la gelée royale ; • Essaimage artificielle ; • Mise en place des hausses et des grilles à reines ; • Production de miel orangé ; • Transhumance vers les steppes (Moutarde blanche).
Aviculture	• Nettoyer régulièrement les bâtiments, l'équipement et les véhicules • Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage ; et doter les fenêtres de grillages ; • Mettre un rotoluve à l'entrée de l'exploitation et un pédiluve à l'entrée du bâtiment d'élevage ; • Entretenir les installations ; • Gérer l'élimination des carcasses et la manipulation de fumier ; • L'aliment doit être équilibré en énergie, protéines, minéraux et en vitamines ; et stocker dans des bonnes conditions ; • Minimiser l'écart thermique entre jour et nuit en respectant le planning des températures selon les âges ; • Respecter la règle de vide sanitaire ; • Respect de protocole de prophylaxie médicale (la vaccination) ; • En cas de pathologie ; faire appel à un vétérinaire (l'automédication est à éviter).
Ruminants	• Faire un traitement antiparasitaire, et vacciner contre l'entérotoxémie avant de mettre les animaux au pâturage ; • Désinfecter le cordon ombilical pour éviter les problèmes sanitaires chez les agneaux nouveau-nés ; • Respecter les règles d'hygiène des bâtiments et du matériel utilisé dans l'élevage ; • Mettre en place un rotoluve à l'entrée de l'exploitation et un pédiluve à l'entrée des étables ; • Limiter l'accès des personnes étrangères ; • Contrôler l'introduction des nouveaux animaux ; • Installer les pierres à lécher ; • Lutter contre les rongeurs et les insectes ; • Protéger le cheptel des animaux errants et des oiseaux sauvages ; • Parage des anglons pour éviter les affections podales ; • Eliminer les cadavres par enfouissement et mettre la chaux ; • En cas de maladie, isoler les animaux malades des animaux sains et faire appel à un vétérinaire.
Cuniculture	• Le bâtiment d'élevage doit être isolé, ventilé, éclairé et loin des agglomérations ; • Nettoyer et désinfecter le bâtiment d'élevage au moins 7jours avant la mise en place des lapins ; • Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage ; • Un bon aliment est un aliment granulé dur sans aucun élément farineux, et stocker à l'abri de l'humidité et des rongeurs ; • Le système d'abreuvement doit assurer une eau fraiche propre et à volonté, • Régler les extracteurs pour permettre à l'odeur d'ammoniac de sortir sans créer un courants d'air afin d'éviter les pathologies respiratoires ; • Vacciner les lapins contre la maladie virale hémorragique, et contre l'entérotoxémie ; • Faire appel à un vétérinaire en cas de maladie ; • Courants d'air afin d'éviter les pathologies respiratoires ; • Vacciner les lapins contre la maladie virale hémorragique, et contre l'entérotoxémie ; • Faire appel à un vétérinaire en cas de maladie.