



تنبيهات زراعية

ذبابة الفواكه على الحمضيات

15/10/2025

سجلت شبكة المراقبة التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات بداية نشاط أفراد بالغة لذبابة الحمضيات على مستوى بساتين الحمضيات بولاية بجاية، الطارف، وهران، عين الدفلى، الشلف، بومرداس، تيبازة و غليزان أين تتواجد أشجار البرتقال في طور "تضخم الثمار" الى "بداية تلون الثمار"، طور حساس و قابل للسعات هذه الحشرة.

في هذا السياق و نظرا للطور الحساس لأشجار البرتقال و الظروف المناخية الملائمة لنشاط هذه الذبابة، نوصي بشدة منتجي الحمضيات بمباشرة المعالجة الكيميائية بالمبيدات الحشرية المناسبة و المرخصة المذكورة في الجدول أدناه، و ذلك لحماية الفاكهة.



توصيات مهمة

- يستحسن استعمال المصائد الفيرومونية و المصائد الغذائية قبل تطبيق المعالجة الكيميائية وهذا للحفاظ على الحشرات النافعة الموجودة في البساتين (المكافحة الوقائية).
- ينصح بتطبيق علاج جزئي (صف على صفين أو شجرة من بين ثلاثة) باستعمال مبيد حشري ملائم ممزوج بجاذب غذائي.
- من الأفضل المعالجة في أواخر النهار و ذلك لفعالية أكثر.



AVERTISSEMENT AGRICOLE

CÉRATITE DES AGRUMES

15/10/2025

Le réseau de surveillance de l'INPV, a révélé des captures d'adultes de la cératite au niveau des vergers agrumicoles des wilayas de Béjaïa, d'Oran, d'El Tarf, d'Ain Defla, de Chlef, de Boumerdes, de Tipaza et de Relizane, où les agrumes se trouvent au stade « grossissement des fruits » à « début véraison », stade sensible et réceptif aux attaques de cette mouche.



Recommandations

- Il est souhaitable d'utiliser des pièges à phéromones et un piège alimentaire avant l'application de la lutte chimique, cela permet de préserver les insectes utiles existants au niveau des vergers.
- Il est conseillé de traiter une rangée sur deux ou un arbre sur trois en ajoutant à l'insecticide, un attractif alimentaire (hydrolysate de protéine).
- Il est préférable de traiter en fin de journée pour une meilleure efficacité.

A cet effet et compte tenu du stade sensible des orangers et des conditions climatiques favorables à la pullulation de ce ravageur, il est préconisé à l'ensemble des agrumiculteurs, de procéder dès à présent, aux traitements chimiques par les insecticides appropriés et homologués cités dans le tableau, afin de protéger les fruits



قائمة المبيدات الحشرية المرخصة ضد حشرة ذبابة الفواكه على الحمضيات

الاسم التجاري Nom commercial	المادة الفعالة Matière active	التركيز Concentration	الجرعة المستعملة Dose d'utilisation	مدة ما قبل الجني D.A.R (jour)
Acetin 20 SL	Acetamipride	200 g/l	20 -30 cc/hl	14
Activap	Pyrimi-Phos-Methyl	50%	20-30 ml/hl	14
Agro Alphythrine 25EC	Deltamethrine	25 g/l	0,5 l/ha	/
Alphythrine 25EC	Deltamethrine	25 g/l	0,5 l/ha	14
Benevia	Cyantraniliprole	100 g/l	100 ml/ha	7
Bioaza 32	Azadirachtine	32 g/l	25-150 ml/hl	3
Check 10 EC	Beta-cyper-methrine	100 g/l	0,2- 0,3 l/ha	7
Ceratrapp	Hydrolisate de protéine	5.5 %	250 à 350 ml/piège	/
Cym 25	Cyperme-thrine	250 G/L	100-150 ml/hl	7
Decis 25 EC	Deltamethrine	25 g/l	0.5 L/ha	14
Decis Expert	Deltamethrine	100 g/l	125 ml/ha	7
DEkacim	Cypermethrin	25%	100-150 mml/hl	14
Dekatrine	Deltamethrine	2,50%	300-500 ml/ha	/
Deltamac 2,5 EC	Deltamethrine	25 g/l	500 ml/ha	15
Deltarin 25	Deltamethrine	2,50%	300-500 ml/ha	14
Deltatop	Deltamethrine	25 g/l	0.5 L/ha	14
Deltrine	Deltamethrine	2,50%	1-1.25 L/ha	14
Impala	Acetamipride	200 g/l	25-50 ml/hl	14
Lebaycid 50 EC	Fenethion	500 g/l	0,3 l/Ha + 0,7 l/Ha d'attractif	15
Nutrel	Proteine hydrolysée	24%	3L/ha	/
Stora	Deltamethrine	2,50%	300-500 ml/ha	14
Success Apat	Spinosad	0.24 g/l	1 L/ha	1 jour
Superalpha 2.5 EC	Esfenvalerate	25 g/l	50 ml/hl	14
Trebon	Etofenprox	287.5 g/l	75-100 cc/hl	7

مستخرج من فهرس مبيدات الصحة النباتية للاستعمال الفلاحي، طبعة 2017 و القائمة الاضافية 2021