

التنبهات الزراعية

نداء للمعالجة

الذبابة البيضاء على الحمضيات

أظهرت شبكة المراقبة للمحطة الجهوية للجزائر عن تواجد مستعمرات الذبابة البيضاء على أشجار الحمضيات على مستوى بلدية تيبازة (ولاية تيبازة) المتواجدة حاليا في مرحلة "تحويل اللون"

لهذا، نوصي الفلاحين بولايات الجزائر، بومرداس و تيبازة الذين لاحظوا هذه الذبابات بالتدخل عن طريق رش المبيدات الحشرية المرخصة والمخصصة لهذا الغرض مع مناوبة المادة الفعالة للمبيد.



N° 04 du : 10/11/2024

Avis de traitement

Aleurodes des agrumes

« La mouche blanche »

Le réseau de surveillance de la SRPV d'Alger a enregistré la présence de colonies d'aleurodes sur les agrumes au niveau de la commune de Tipaza (W. Tipaza) qui se trouvent actuellement au stade « *véraison* ».

A cet effet, il est préconisé aux agriculteurs des wilayas d'Alger, de Boumerdes et de Tipaza qui ont observé ces mouches, de procéder aux traitements de leurs cultures en utilisant l'un des insecticides appropriés et homologués à cet usage tout en respectant l'alternance de la matière active.



LISTE DES INSECTICIDES :

Nom commercial	Matière Active	Concentration	Dose	DAR (jour)	Observation
ACEPLAN 20 SP	ACETAMIPRIDE	20%	20 - 30 g/hl	14	
ACTEVAP	PYRIMI-PHOS-METHYL	50%	20-30 ml/hl	14	Sévèrement réglementé
ASTRAD	ACETAMIPRIDE	20%	100.125g/ha	14	
CHLORPRID	IMIDACLOPRIDE *	200 g/L	50 ml/hl	07	Toxique pour les abeilles ; - Eviter pendant la période de floraison
COMODOR 20 SL	IMIDACLOPRIDE *	200 g/L	0.5 L/ha	-	Produit toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison
CONFIDENTE 20 SL	IMIDACHLOPRIDE *	200G/L	150 ml/Ha	14	
CONFIDOR® SUPRA	IMIDACLOPRIDE *	700 g/Kg	150 g/ha	14	Toxique pour les abeilles ; - Eviter pendant la période de floraison
CYTHRIN 250 EC	CYPERMETHRINE	250 g/L	100-150 ml/ha	15	
EXTRACHIM	LUFENURON	5%	1L/ha		
FIDOR SUPER 70	IMIDACLOPRIDE *	70%	150 g/ha	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison
LIMOCIDE	Huile essentielle	60 g/l			
GHAZAL 20 SP	ACETAMIPRIDE	20%	25-40 g/hl	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison
MIDA	IMIDACLOPRIDE *	200 G/L	0.5L/HA	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison
MOSPILATE 20 SP	ACETAMIPRIDE	20%	20 - 30 g/h	15	
IMAXI 200 SL	IMIDACLOPRIDE *	200 g/L	50 ml/hl	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison
IMIDAGRI	IMIDACLOPRIDE *	200 g/L	0.5 L/ha	14	Restriction d'emploi dangereux pour les abeilles Interdit pendant LA FLORAISON
IMIGUARD 20 % SL	IMIDACLOPRIDE *	200 g/L	0,5 L/ha	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison
TMRID SP 20%	ACETAMIPRIDE	20%	200 à 300 g/ha	14	Produit dangereux pour les abeilles Interdit sur végétaux pendant la floraison

* Substance active autorisée à la commercialisation et à l'utilisation pour l'écoulement du stock national existant

Source :

INDEX DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE. EDITION 2017 ET LA LISTE ADDITIVE
2021.

INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek Hassen Badi – BP 80 El-Harrach Alger

Tél/Fax : 023-82-88-85

Site Web : www.inpv.edu.dz

Email : srpvalger@gmail Page facebook: الصفحة الرسمية المحطة الجهوية الجزائر

Mme MEDJAOUR L
Chargée dossier appui
Technique SRPV Alger